

# Médicament ASPIRINE UPSA VITAMINÉE C

## Dans quel cas le médicament ASPIRINE UPSA VITAMINÉE C est-il prescrit ?

Ce médicament associe de l'aspirine, antalgique et antipyrétique, et de la vitamine C. Il est utilisé dans le traitement symptomatique des affections douloureuses ou fébriles.

## Présentations du médicament ASPIRINE UPSA VITAMINÉE C

**ASPIRINE UPSA vitaminée C** : comprimé effervescent sécable (blanc) ; boîte de 20

## Composition du médicament ASPIRINE UPSA VITAMINÉE C

	p cp
Acide acétylsalicylique (aspirine)	330 mg
Acide ascorbique (vitamine C)	200 mg
Sodium	485 mg

Substances actives : Acide acétylsalicylique, Acide ascorbique  
Excipients : Acide citrique, Bicarbonate de sodium, Glycine, Povidone, Sodium, Sodium benzoate

## Contre-indications du médicament ASPIRINE UPSA VITAMINÉE C

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie aux salicylés ou aux AINS,
- antécédent d'asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'AINS,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- hémorragie et risque hémorragique,
- antécédent de calculs des voies urinaires (pour les doses de vitamine C supérieures à 1 g par jour),
- **grossesse** : à partir du 6<sup>e</sup> mois.

### Attention

Un avis médical est préférable en cas d'insuffisance rénale, d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, même ancien, et chez la femme qui porte un stérilet.

L'aspirine est déconseillée chez les personnes atteintes de goutte.

Évitez de prendre ce médicament pendant la semaine qui précède une extraction dentaire, une opération, ou lors de règles abondantes : augmentation du risque d'hémorragie.

L'utilisation d'aspirine chez l'enfant doit être prudente en cas de varicelle ou de fièvre due à un virus (grippe...). Des cas de syndrome de Reye, rarissimes, mais parfois mortels, ont été constatés. Ce syndrome se traduit par des troubles de la conscience et des vomissements. En cas de fièvre due à un virus, et en l'absence d'avis médical, d'autres antipyrétiques (paracétamol, par exemple) doivent être préférés.

Ce médicament contient du sel (sodium) en quantité notable.

## Interactions du médicament ASPIRINE UPSA VITAMINÉE C avec d'autres substances

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, notamment :

- les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : risque accru d'effets indésirables ;
- les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires (**PLAVIX**...) : augmentation du risque hémorragique ;
- les médicaments contenant du méthotrexate ou du probénécide.

Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un antidiabétique, un antihypertenseur de la famille des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des inhibiteurs de l'angiotensine II, un diurétique, ou un corticoïde.

## Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

Des effets néfastes pour la mère et l'enfant à naître ont été mis en évidence lorsque l'aspirine, comme les autres AINS, est utilisée au cours des 4 derniers mois de la grossesse ; le risque existe même avec une seule prise et même si la grossesse est à terme.

En conséquence, en dehors de certaines situations médicales très particulières, l'aspirine ne peut être utilisée que de façon ponctuelle pendant les 5 premiers mois, et son usage est contre-indiqué à partir du 6<sup>e</sup> mois.

Allaitement :

L'aspirine passe dans le lait maternel : son usage prolongé et à fortes doses chez la femme qui allaite nécessite un avis médical préalable.

## Mode d'emploi et posologie du médicament ASPIRINE UPSA VITAMINÉE C

Les comprimés doivent être dissous dans un verre d'eau, de lait ou de jus de fruits.

Respecter un intervalle d'au moins 4 heures entre 2 prises.

Posologie usuelle :

- Adulte : 1 ou 2 comprimés par prise, à renouveler si nécessaire, sans dépasser 9 comprimés par jour.  
Chez le sujet âgé, il est conseillé de ne pas dépasser 6 comprimés par jour.
- Enfant de 30 à 50 kg : 1 comprimé par prise, à renouveler si nécessaire, sans dépasser 6 comprimés par jour.

Conseils

De nombreux médicaments contiennent de l'aspirine ; vous devez en tenir compte en cas de prise conjointe car un surdosage expose à une augmentation des effets indésirables.

## Effets indésirables possibles du médicament ASPIRINE UPSA VITAMINÉE C

Liés à l'aspirine :

- gastrite, douleurs abdominales, saignement du nez ou des gencives ;
- rares et parfois graves : hémorragie du tube digestif (vomissements sanglants, selles noires, ou plus souvent pertes de sang imperceptibles, responsables de l'apparition progressive d'une anémie) ; accidents allergiques (urticaire, œdème, asthme) ;
- signes devant faire penser à un surdosage : bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'audition, maux de tête.

Liés à la vitamine C à forte dose (supérieure à 1 g par jour) : calculs des voies urinaires chez les personnes prédisposées.

Laboratoire Bristol-Myers Squibb

**Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.**



Pharmacie Paget  
2 rue Pasteur  
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02  
Fax 05.63.38.96.10

pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

**Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.**